

LOGGA

SMITTSKYDDSREGLEMENTE FÖR SVENSK TRAVSPORT

Nedanstående är tillämpningsanvisningar avseende 28§ i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

Dessa anvisningar gäller fr.o.m. 2009-10-01 **med senaste uppdatering 2021-01-01** och ersätter delar av tidigare anvisningar i "Om Smittan Kommer".

Influensa

Svensk Travsport införde obligatorium avseende vaccination fr.o.m. 2009-10-01. Alla travhästar/-ponnyer ska vara vaccinerade för att få anmälas till lopp. En tävlande häst kan anmälas till start eller medföljande häst komma till en tävlingsplats på en svensk bana när den fått A- och B- vaccinationen.

Vaccinationsintervall

1) Grundvaccinering

Med grundvaccinering menas tre vaccinationer (A + B + C) med följande intervall:

A-vaccination, kan ges från fem månaders ålder

B- vaccination, 21 – 60 dagar efter A- vaccination

C-vaccination, 120 – 180 dagar efter B- vaccination

3) Revaccinering (R- vaccination)

Alla travhästar/-ponnyer ska revaccineras minimum var tolfte månad (365 dagar) för att vara fortsatt anmälningsberättigade till lopp.

Över- eller underskriden senaste vaccinationsdag

I det fall kortare tid än 21 dagar eller längre tid än 60 dagar förflutit mellan vaccination A och B så blir vaccinationen registrerad som en A-vaccination.

I det fall kortare tid än 120 dagar eller längre tid än 180 dagar förflutit mellan vaccination B och C så blir vaccinationen registrerad som A- vaccination.

I det fall mer än 365 dagar förflutit från R-vaccination inträder anmälningsförbud. Hästen behöver då åter grundvaccineras men är anmälningsberättigad efter att ha fått en A- och B- vaccination.

Registrering

Det är tränaren som är ansvarig för att vaccinationer mot hästinfluensa registreras hos oss på Svensk Travsport. Vaccinationsregistreringen görs enklast via tränarens användarkonto på travsport.se. Du

som av någon anledning inte har möjlighet att registrera vaccination via webben kan vända dig till din hemmabana eller Svensk Travsports kundtjänst för att få hjälp.

Utländska hästar

Hästar som gästar Sverige för enskilt lopp skall senast 365 dagar före anmälningstidens utgång vara vaccinerade.

Åtgärder vid misstanke/konstaterad influensa och isoleringsrutiner

- Tränare (eller annan ansvarig) skall omedelbart isolera hela stallet och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via sekretariaten) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning skall utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports Hästvelfärdsavdelning eller lokala smittskyddsveterinären. Svensk Travsport står för kostnaderna av primärfallen i ett stall/anläggning.
- Alla hästars kroppstemperatur skall varje dag mätas och antecknas. Anteckningarna skall kunna uppvisas om Svensk Travsport eller lokal smittskyddsveterinär begär det.
- Isoleringen skall gälla 5 dygn (120 timmar) efter senast registrerad temperaturopp (alla hästar i stallet skall vara minst grundvaccinerade). För stall med hästar som enligt Svensk Travsports regler är ofullständigt vaccinerade gäller en isoleringstid om 10 dygn (240 timmar). Den lokala smittskyddsgruppen eller smittskyddsveterinären skall godkänna att isoleringen hävs.
- Isolerad häst får inte startanmälas.
- Svensk Travsport eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående.

Kvarka

Under denna rubrik behandlas även sjukdomar som orsakar "kvarkaliknande" symptom utan att vara orsakad av "kvarkabakterien" *Streptococcus Equi* (dvs. isoleringstider etc. är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad kvarka och isoleringsrutiner

- Tränare (eller annan ansvarig) skall omedelbart isolera hela stallet och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via sekretariaten) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning skall utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports veterinäravdelning eller lokala smittskyddsveterinären. Svensk Travsport står för kostnaderna av primärfallen i ett stall/anläggning.
- Alla hästars kroppstemperatur skall varje dag mätas och antecknas. Anteckningarna skall kunna uppvisas om Svensk Travsport eller lokal smittskyddsveterinär begär det.
- Stallet skall hållas isolerat intill dess att 20 dygn har förflutit från det att ingen häst längre visar symptom som näsflytning eller feber.
- Om sjuka hästar har förflyttats till isoleringsstall skall det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i 10 dygn under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknar, samma gäller stall dit eventuellt friska hästar flyttas.
- Isolerad häst får inte startanmälas.
- Svensk Travsport eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga isoleringstiden eller införa andra

restriktioner oavsett ovanstående.

MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus)

Åtgärder vid misstanke/konstaterad MRSA

Tränare (eller annan ansvarig) skall omedelbart isolera hästen och kontakta lokala smittskyddsgruppen och/eller lokal smittskyddsveterinär, som övertar ansvaret för vidare åtgärder.

Häst/ar som har en MRSA-infektion

Häst med symptom i form av allmäninfektion eller lokal infektion i exempelvis sår, hudskada, led eller andra organ skall hållas kontaktisolerad (egen utrustning, skötsel, handsprit till skötare etc.) intill dess att 20 dygn har förflutit från det att hästen inte visar smittoförande symptom eller skador i huden. Sår som kan vara tveksamma, t.ex. karledsproblem och liknande, skall vara provtagna och befunna negativa innan hästen får startanmälas.

Friska hästar som står i stall med MRSA-infekterad häst

Dessa kan tävla under förutsättning att den infekterade hästen har blivit kontaktisolerad från övriga hästar enligt ovan, annars gäller samma restriktion om 20 dygn som för den infekterade hästen.

Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA

Om hästen inte har några kliniska symptom på infektion, har intakt hud och inte behandlas med antibiotika så omfattas den normalt inte av ovanstående restriktioner, då smittrisen anses som försumbar i tävlingssammanhang.

Friska hästar som står i stall med symptomlösa bärare av MRSA

Omfattas normalt inte av tävlingsrestriktioner.

- *Isolerad häst får inte startanmälas*

- *Svensk Travsports Hästvälfärdsavdelning eller lokal smittskyddsveterinär kan införa ytterligare restriktioner oavsett ovanstående.*

Ringorm

Under denna rubrik behandlas även andra smittsamma hudsjukdomar (dvs. behandlingar och isoleringstider är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad ringorm (el. liknande)

- Tränare (eller annan ansvarig) skall omedelbart isolera hästen och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via sekretariaten) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.

- Provtagning skall utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports Hästvälfärdsavdelning eller lokala smittskyddsveterinären.

Behandling av hästar med symptom

Häst skall lokalbehandlas med adekvat läkemedel (eller annat antimykotikum) angivet/utskrivet av veterinär. Behandling minst 2 ggr/vecka i 2 veckor (dvs. minst fyra behandlingar). Om behandlingen varit verksamt och ingen akutisering inträffat hävs isoleringen efter 20 dygn räknat från 1:a

behandlingsdag.

Behandling av symptomfria hästar från smittat stall

Dessa skall behandlas med av veterinär anvisat läkemedel (eller annat antimykotikum) inom en vecka före start, dock senast dagen innan start/ankomst till tävlingsplats. Observera eventuell karenstid om hästen behandlats med läkemedel.

Övriga smittsamma sjukdomar

Regleras av Djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Se 2§ i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

Kontakta lokal smittskyddsveterinär eller Svensk Travsports Hästvälfärdsavdelning för rådgivning när övriga smittsamma sjukdomar konstateras.

Svensk Travsport och/eller lokal smittskyddsveterinär äger rätt att utfärda restriktioner och anvisa åtgärder för dessa stall/anläggningar.

OBSERVERA: Ingen häst som, oavsett orsak, står under isolering får startanmälas.